

大麻与驾驶

- 食用THC后, 在受其影响下驾驶及对路况危险状况的反应都是不安全的, 这和酒驾是同样的道理。
- 酒精和大麻混合使用是上瘾的, 这就意味着同时食用两者的损害比只食用其中任何一种都更大。

大麻和酒精

- 人们同时吸食大麻和饮酒时, 可能感到恶心和/或呕吐, 或者感到恐惧、焦虑或嗜睡。这增加了弱势人群出现精神症状的风险。
- 有些证据显示, 血液中含有酒精时对THC的吸收更快, 会造成比大麻普通效果更强的后果, 可能导致中毒的症状。
- 中毒是一个常用的术语, 指人们吸食大麻后的不适反应。患者可能脸色苍白、发汗、头晕、恶心, 甚至可能开始呕吐。



更多信息

要获取药物滥用帮助中心转介
请致电1-800-662-HELP或访问
<https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline>

麻州急诊室医生学院感谢麻州大学

毒理分部
<https://umasstox.com/>

THC 和大麻事实信息手册来自
国家药物滥用研究院
<https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana#ref>



Massachusetts College
of Emergency Physicians

860 Winter Street
Waltham, MA 02451

www.macep.org
781-890-4407



大麻 的隐藏 危险

大麻是指寻常大麻或印度大麻植物
晾干后的叶、花、茎和种子。

这种植物包含影响人们精神状态的化学
物质THC及其他类似化合物。

接触大量的THC会极大增加产生有害
反应的几率。

食用大麻中的化学物质也会增加有害
反应的几率。

食用大麻的消化时间长, 让人感到亢奋。

因此, 人们可能食用量更大以更快地感觉
亢奋, 导致了危险的后果。

macep



Massachusetts College
of Emergency Physicians
860 Winter Street
Waltham, MA 02451
www.macep.org
781-890-4407

合成大麻

- 合成大麻应是仅供研究之用的化学物质，永远都不应该用于人类食用！
- 目前没有法规监督各种非法合成大麻的生产，因此没有安全保障。
- 合成大麻可能造成各种恶性反应，从暴怒到完全失去知觉各种症状都可能发生。
- 合成大麻中毒症状多种多样，很难实施戒毒治疗，也对身体的各器官造成伤害。



大麻剧吐综合症

- 患有这种病的人每天呕吐并感觉腹痛，严重影响每日正常生活。
- 通常，每天食用大麻并连续食用几天、几周或更长的时间后开始出现这种症状。
- 热水淋浴后症状会缓解，停止食用大麻后症状通常会自行消失。

食用大麻

- THC 被添加到饼干、巧克力布朗尼、糖果、奶油、蛋糕、巧克力、食用油、饮料等食品中。
- 具体症状和体验因人而异。个体可能没有他人使用THC所表现的同样症状。
- 食用THC和吸食THC的症状也可能不同。
- 症状可能在60分钟内发作，然后持续4到12小时。
- 每种可食用大麻可能含有大量的THC，因此每个产品（例如一块糖或一整块巧克力布朗尼）只食用其一小部分，并分多次食用。
- 一整块巧克力布朗尼或一块糖可能含有高达100mg的THC，这是建议食用量的10到20倍！
- 食用大麻产品过多太快可能导致严重超标过量。
- 超量食用大麻可能导致暴怒、妄想、焦虑和幻觉等症状。
- 超量食用大麻的后果很难预测，使用者可能将自己和他人陷入危险的境地。



您能看出差别吗？

儿童接触食用大麻

- 食用大麻被包装成看起来就像普通糖果和其他食品一样。
- 这就很吸引儿童，孩子们可能由于味道好吃而大量食用。
- 儿童是因含有高浓度THC食用大麻而中毒的高风险群体。
- 儿童可能会感到心跳加速、暴怒、烦躁、严重嗜睡，而且可能终止呼吸。



大麻油膏

- 大麻油膏可能有蜡、玻璃或粉碎等多种形状，是由高浓度THC做成的蜡状小块。
- 最终产品中的高浓度THC可能导致严重的过量中毒风险。

