

## MACONHA E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

- Quando sob a influência de THC, não é seguro dirigir e reagir aos perigos na estrada, como acontece com o álcool.
- A combinação de bebida alcoólica com maconha potencializa os efeitos, o que significa que o dano é pior em conjunto do que com uma ou outra substância isoladamente.

## MACONHA E ÁLCOOL

- Quando as pessoas fumam maconha e bebem álcool ao mesmo tempo podem sentir náuseas e/ou vômitos, ou podem reagir com pânico, ansiedade ou paranoia. Isso aumenta o risco de pessoas vulneráveis apresentarem sintomas psicóticos.
- Algumas evidências comprovam que a presença de álcool em seu sangue provoca uma absorção mais rápida de THC. Isso pode levar a maconha a ter um efeito muito mais forte do que normalmente teria e poderia resultar em efeitos adversos ('greening out').
- 'Greening out' é um termo mencionado comumente em situações em que as pessoas se sentem doentes depois de fumar maconha. Elas ficam pálidas, suam muito, sentem tonturas, náuseas e podem mesmo começar a vomitar.



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para indicações de Centros de Ajuda para abuso de substâncias Ligue para 1-800-662-HELP ou consulte o site <https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline>

A faculdade College of Emergency Physicians de Massachusetts Agradece à Divisão de Toxicologia Médica da Universidade de Massachusetts - <https://umasstox.com/>

Fatos sobre THC e Maconha em folheto do Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas <https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana#ref>



Massachusetts College  
of Emergency Physicians

860 Winter Street  
Waltham, MA 02451

[www.macep.org](http://www.macep.org)  
781-890-4407



# Os PERIGOS Ocultos da maconha

A expressão **MACONHA** refere-se às folhas, flores, caules e sementes secas das plantas *Cannabis sativa* ou *cannabis indica*.

A planta contém a substância **psicoativa THC (tetra-hidrocarbinol) de alteração da mente** e outros compostos semelhantes.

A exposição a níveis mais elevados de THC tem uma chance maior de **reação prejudicial**.

A química de produtos comestíveis com maconha também aumenta a probabilidade de reações prejudiciais.

Os produtos comestíveis levam mais tempo para serem digeridos e produzem um 'barato'.

Portanto, as pessoas podem consumir mais para sentir os efeitos mais rapidamente, levando a **consequências perigosas**.

macep



Massachusetts College  
of Emergency Physicians

860 Winter Street  
Waltham, MA 02451

[www.macep.org](http://www.macep.org)  
781-890-4407

## CANABINÓIDES SINTÉTICOS

- Eles surgiram como produtos químicos para pesquisas. NUNCA foram destinados ao consumo humano!
- Não existem normas para supervisionar a produção dos inúmeros tipos de produtos químicos ilegais de maconha sintética, não havendo, portanto, nenhuma garantia de segurança.
- Existem produtos sintéticos capazes de causar qualquer tipo de sintoma, desde uma agitação extrema do usuário até a indução do estado de coma.



## SÍNDROME DE HIPEREMESE POR CANABINÓIDE

- Esta é uma doença que provoca vômitos e dores abdominais graves todos os dias, capazes de interferir na sua vida diária normal.
- Em geral, começa após dias, semanas, ou até mais tempo do uso diário da maconha.
- As pessoas podem encontrar alívio com banhos quentes de chuveiro e o quadro clínico desaparece com frequência após parar o uso da maconha.

## PRODUTOS COMESTÍVEIS

- O THC é adicionado a biscoitos, brownies, doces, manteigas, bolos, chocolates, óleos vegetais, bebidas, etc.
- Os sintomas e experiências afetam pessoas distintas de maneira diferente. Ao usar o THC, uma pessoa pode não sentir os mesmos efeitos que as outras pessoas.
- Os sintomas ao ingerir THC podem ser diferentes do que ao fumar THC.
- O início dos sintomas pode levar 60 minutos e depois durar de 4 a 12 horas.
- Cada produto comestível pode conter grandes quantidades de THC, de modo que um produto (por exemplo, uma barra de chocolate ou um brownie inteiro) é feito para ser consumido em pequenas porções e destina-se a vários usos.
- Um brownie inteiro ou uma barra de chocolate podem conter até 100 mg de THC - equivalente a 10 a 20 vezes a dose sugerida!
- A ingestão muito rápida de uma grande quantidade do produto pode levar a overdoses significativas.
- A overdose pode causar agitação, paranoia, ansiedade e alucinações.
- Os efeitos da overdose são difíceis de se prever e podem expor os usuários ao risco de lesões em si mesmos e em outras pessoas.



## CRIANÇAS EXPOSTAS A PRODUTOS COMESTÍVEIS

- Os produtos comestíveis são embalados como doces e outras guloseimas.
- Isso os torna apetitosos para as crianças e estas vão comê-los em grandes quantidades por serem saborosos.
- As crianças correm alto risco de intoxicação devido às concentrações elevadas de THC em produtos comestíveis.
- Elas vão sentir batimentos cardíacos elevados, agitação, irritabilidade, sonolência grave e podem parar de respirar.



## DABS (CONCENTRADOS DE CANNABIS)

- Dabs em várias formas, tais como wax, glass ou shatter, são pequenas porções de THC altamente concentrado em uma forma semelhante à cera.
- A alta concentração de THC no produto final apresenta um risco significativo de overdose.

