

MARIHUANA Y MANEJAR

- Cuando uno está bajo la influencia de la THC, no es seguro manejar y responder a los peligros del camino, igual que con el alcohol.
- Combinar el alcohol y la marihuana es aditivo, lo que significa que el impedimento es peor juntos que con cada sustancia por separado.

MARIHUANA Y EL ALCOHOL

- Cuando las personas fuman marihuana y beben alcohol al mismo tiempo, pueden experimentar náusea y/o vómitos o pueden reaccionar con pánico, ansiedad o paranoia. Esto aumenta el riesgo de que las personas vulnerables experimenten síntomas psicóticos.
- Existe cierta evidencia que apoya que tener alcohol en la sangre causa una absorción más rápida de la THC. Esto puede llevar a que la marihuana tenga un efecto mucho más fuerte del que normalmente tendría y podría resultar en "greening out".
- "Greening out" es un término que generalmente se refiere a una situación donde las personas se sienten enfermas después de fumar marihuana. Pueden sufrir palidez y transpiración, sentirse mareados, náusea y hasta pueden comenzar a vomitar.



MÁS INFORMACIÓN

Para derivaciones a centros de ayuda al abuso de sustancias Por favor llame al 1-800-662-HELP o visite <https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline>

The Massachusetts College of Emergency Physicians (El Colegio de Médicos para Emergencias de Massachusetts) Gracias a la División de Toxicología Médica de la Universidad de Massachusetts <https://umasstox.com/>

Los datos de la THC y la marihuana en el folleto del Instituto Nacional de Abuso de Drogas <https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana#ref>



Massachusetts College
of Emergency Physicians

860 Winter Street
Waltham, MA 02451

www.macep.org
781-890-4407



PELIGROS Ocultos de la marihuana

LA MARIHUANA se refiere a las hojas, flores, tallos y semillas secas de la planta Cannabis sativa o Cannabis indica.

La planta contiene el producto químico **THC** que altera la mente y otros compuestos similares.


La exposición a niveles más altos de THC crea mayor posibilidad de generar una **reacción peligrosa**.

La química de los comestibles también aumenta la posibilidad de sufrir reacciones peligrosas.

Los comestibles requieren más tiempo para la digestión y producir el efecto deseado.

Por lo tanto, las personas podrían consumir más para sentir los efectos con más rapidez, lo que **lleva a crear resultados peligrosos**.

macep



Massachusetts College
of Emergency Physicians
860 Winter Street
Waltham, MA 02451
www.macep.org
781-890-4407

CANNABINOIDES SINTÉTICOS

- Fueron creados como productos químicos para la investigación. ¡No fueron NUNCA creados para el consumo humano!
- No hay regulaciones que supervisen la producción de los numerosos tipos de productos químicos sintéticos ilegales de la marihuana, por lo tanto, no se puede garantizar su seguridad.
- Existen productos sintéticos que pueden causar cualquier tipo de síntomas, desde hacer que el usuario se sienta severamente agitado hasta causar un estado parecido al coma.
- La amplia variedad de presentaciones puede hacer que la intoxicación sea difícil de tratar y puede causar daños a diferentes órganos del cuerpo.



SÍNDROME DE LA HIPERÉMESIS CANNABINOIDE

- Esta es una enfermedad de severos vómitos diarios y dolor abdominal que puede interferir con su vida diaria.
- Usualmente comienza después de días a semanas, o más tiempo, de haber usado la marihuana.
- Las personas pueden encontrar alivio con duchas calientes y a menudo se resuelve después de dejar de usar la marihuana.

COMESTIBLES

- La THC se agrega a galletas, bizcochos de chocolate, caramelos, mantequillas, tortas, chocolates, aceites, bebidas, etc.
- Los síntomas y las experiencias afectan de manera diferente a diferentes personas. Una persona podría no sentirlo de la misma manera que otras personas que usan la THC.
- Los síntomas de consumir THC puede ser diferentes a fumar THC.
- El comienzo de los síntomas puede llevar 60 minutos y luego durar entre 4 y 12 horas.
- Cada comestible puede contener grandes cantidades de THC, de manera que un producto (por ejemplo, una barra de chocolate o un bizcocho de chocolate) debe ser consumido en porciones pequeñas y durante varios usos.
- Un bizcocho de chocolate o barra de chocolate entera puede contener hasta 100 mg de THC, eso es 10 a 20 veces la cantidad sugerida.
- Las sobredosis significativas pueden ocurrir al comer demasiado producto con demasiada rapidez.
- La sobredosis puede causar agitación, paranoia, ansiedad y alucinaciones.
- Los efectos de la sobredosis pueden ser difíciles de predecir y pueden crear serios riesgos a los usuarios mismos y a los demás.



¿Puedes decir la diferencia?

NIÑOS EXPUESTOS A COMESTIBLES

- Los comestibles son empaquetados de maneras que parecen caramelos y otras delicias.
- Esto hace que sean atractivos para niños, quienes consumirán mucha cantidad porque tiene buen sabor.
- Los niños corren alto riesgo de intoxicación de las altas concentraciones de THC en los comestibles.
- Los niños experimentarán ritmos cardíacos altos, agitación, irritabilidad, somnolencia severa y hasta pueden sufrir paros respiratorios.



DABS

- "Dabs", en distintas formas como cera, vidrio, o "shatter", son pequeñas porciones de THC altamente concentrada en una sustancia parecida a la cera.
- La alta concentración de THC en el producto final crea un riesgo significativo de sufrir una sobredosis.

